

乐观看待

怀孕后请关注您的乙型肝炎

可以对乙型肝炎进行悉心管理

请确保照顾好您自己以及您的宝宝。

即便您感觉良好，并且没有任何症状，也应保持每6-12个月进行一次肝脏检查，看看是否需要治疗，这一点很重要。

让您的家人和那些与您生活在一起的人都接受检查并接种疫苗。



欲知更多信息

- 请向您的医生或助产士问询
- 请向维多利亚州肝炎协会咨询
网址: www.hepvic.org.au/mumstob
电子邮件: admin@hepvic.org.au
- 肝炎咨询热线电话: **1800 703 003**




翻译和口译服务电话: **131 450**

HEPATITISVICTORIA
与...合作



Mums to B
照顾患有乙型肝炎的妈妈

HEPATITISVICTORIA



您是否知道...

病情须知

给患有乙型肝炎的妈妈提供额外的照顾

- 未经治疗的乙型肝炎是肝癌的主要致病原因。
- 有些移民社区的人患乙型肝炎和与乙型肝炎相关的肝癌的风险更高。
- 乙型肝炎最常见的传播途径是在孩子出生时的母婴传播。
- 90%在出生时接触乙型肝炎的婴儿会发展成慢性（终生性的）乙型肝炎。

按照下面的步骤，您能防止您的宝宝患上乙型肝炎。

妊娠期

请您的医生将您转介至慢性肝炎临床服务机构，给您的肝炎病情做一个全面评估，商讨孕期的最佳管理方案。

请您的医生检查您的病毒载量（即在您身体中循环的病毒数量）。如果数量很高，可能会建议治疗以更好地保护您的宝宝。

宝宝出生时

请确保您的宝宝接受：

- ✓ 第一剂乙型肝炎疫苗

所有的婴儿都应在出生时接种第一剂乙型肝炎疫苗。乙型肝炎疫苗很安全，并能给您的宝宝终身保障。

- ✓ 一剂量的乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）

所有由患有乙型肝炎的母亲所生的婴儿也都必须在出生后12个小时内注射一次乙型肝炎免疫球蛋白。

如果正确注射的话，接种乙型肝炎疫苗和乙型肝炎免疫球蛋白会将病毒传播的风险降低90%。

确保您的宝宝同一时间接受两种注射（乙型肝炎疫苗+乙型肝炎免疫球蛋白）。

出生后

确保您的宝宝按时接种乙型肝炎疫苗：

婴儿年龄：	您的宝宝应接受：
出生时	第1剂乙型肝炎疫苗+乙型肝炎免疫球蛋白
2个月	第2剂乙型肝炎疫苗
4个月	第3剂乙型肝炎疫苗
6个月	第4剂乙型肝炎疫苗
9-18个月	乙型肝炎血检，以确定您的宝宝已受到保护

母乳喂养被认为是安全的。没有任何证据表明乙型肝炎是通过母乳喂养传播的。如果您有顾虑，请与您的医生交谈

