

ការធ្វើតេស្ត៖ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដឹង ថាតើមនុស្សម្នាក់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬអត់ គឺដោយការធ្វើតេស្តឈាម។

1. ការធ្វើតេស្តអង្គបដិបក្ខ

នេះនឹងបង្ហាញថាតើមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ដែលបានប៉ះពាល់នឹងវីរុសដៃរប្រភេទ C រឺមិនមាន ន័យថាពួកគេបច្ចុប្បន្នមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុង ការធ្វើតេស្តលើកទីពីរ ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តអង្គបដិបក្ខនេះជាលទ្ធផលវិជ្ជមាន។

សំខាន់៖ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថា ការធ្វើតេស្តអង្គបដិបក្ខប្រាណវិជ្ជមាន មិនមានន័យថាអ្នក ត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹង ឬមានភាពសុវត្ថិភាពនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះទេ។ មិនមានការចាក់ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ទេ ហើយអ្នកអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ច្រើនជាង ម្តង។

2. ការធ្វើតេស្តរកមើលមេរោគ (តេស្ត PCR)

តេស្ត PCR រកមើលមេរោគ ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ ថាតើបច្ចុប្បន្នមនុស្សម្នាក់មាន ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬអត់។

ការធ្វើតេស្តទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានបញ្ជូនទុក និងអនុវត្តនៅថ្ងៃតែមួយ។ សេវាកម្មឯកទេស ខាងឱសថ និងគ្រឿងញៀន គ្រឿងស្រវឹង មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើន ហើយអាចមាន ឧបករណ៍ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីការធ្វើតេស្តឈាម។

FibroScan

នេះគឺជាអេកូពិសេសដែលប៉ាន់ស្មានពីទំហំនៃការខូចថ្លើម។ ពេលខ្លះ FibroScan ត្រូវធ្វើមុន ពេលទទួលការព្យាបាល ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក នឹងអាចផ្តល់ជំនួយអំពីកន្លែង ដែលត្រូវធ្វើ។ វាជាដំណើរការឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងគ្មានការឈឺចាប់។