

ការទប់ស្កាត់៖ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាមនឹងឈាម ដូចជា៖

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាក់មូលរួមគ្នា រួមមាន ស៊ីរាំង ស្លាបព្រា សំណាក និងក្រណាត់ចងទប់ឈាម។
- ការសាក់ស្បែកដែល 'គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ' ឬការចោះស្បែក។
- ការចាក់បញ្ចូលឈាមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនឆ្នាំ 1990។
- នីតិវិធីវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួននៅឯបរទេស។

ប្រសិនបើអ្នកចាក់គ្រឿងញៀន វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការព្យាយាម និងប្រើឧបករណ៍ចាក់មូលដែលស្អាត ពេលណាអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកអាចទទួលបានកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់មូលចាក់ និងស៊ីរាំង (Needle and Syringe Programs - NSPs)។ ទីតាំងនៃ NSP មានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីនេះ។ នេះរួមមានសេវាកម្ម NSP ចល័តដែលអាចធ្វើដំណើរមកជួបអ្នក។

